

**Ortopedické oddělení**

Identifikace

Narozen/a

Pohlaví

Plátce

Adresa

**Návštěva ambulance / ordinace**

Dg.

Přichází s náplní v obl olekranonu L lokte bez úrazu.

Obj: v obl olekranonu chabá burza s náplně a flutuací, tkáně bez zn inflamace, pohyb bolný, perif intaktní  
RTG lokte bez strukturálních změn

Th: za sep pomínek provedena punkce burzy s aspiraci cca 12 ml průhledné synovie, poté Depov MeSo do burzy, elastický obvaz

Zá: Bursitis olekrani vlevo

dop.p dnes a zítra ledovat, analgetika p.p., žádné teplo na loket týden, sprchovat vlažnou vodou, ko zde p.p.

Pacient: [redacted]

Adresa: [redacted]

Číslo pojištění: [redacted]

Pojišťovna: [redacted]

Základní dg.:

Vedlejší dg.:

rč: [redacted]

technik

vyklenutí na zadní straně lok kl vpravo. Podobné bylo i na lok .kl .vlevo. Potíže odezněly po punkci na chir. nem. [redacted] aplikované kortikoidy. a KV Potíže jsou spojené s povšechnými bolestmi kloubními.

O lehce naplněná bursa olekranu vpravo. Kůže je klidná, spodina bursy bez výraznějších prominencí. Druhý loketní kl norm reliefs Podobné je naplnění bursy praepat. vpravo a méně i vlevo. Kůže je též klidná

závěr: hydrops bursy olekranu bila praepat. bil.

dop. Pokud by souč potíže recidivovaly, tak by bylo nutné uvažovat o extirpaci bursy Předtím by bylo vhodné vyloučit systémový zánět



## Zdravotní záznam

Strana: 1 / 1

Příjmení:

Rodné číslo:

Pojišťovna:

Jméno:

Bydliště:

PSČ:

Titul:

Ulice:

Kontakty:

O

Lékař:

RČ:

Dg.:

Pacient přichází k ošetření pro rez preptel. oboustr., a nad P lokitem,.

Bursitis prepatelartis l. utrq.,

“ bursitis olecrani l.dx.

Th.- pce.- evakuace serosan. tek peptel.

sertoznmí tek. v oblasti, . lokte.

KO zde dle potřeby.

## Ortopedické vyšetření na příjmové ambulanci

Pacient: [redacted] Plátce: [redacted] Datum vyšetření: [redacted]  
RČ: [redacted] Č.P.: [redacted] Útvar: [redacted] Dg: [redacted]  
Trvalé bydliště: [redacted] Ročník: [redacted]

Pac. odeslán z chir. amb. [redacted] pro náplň burzy L lokte

O: L loket. - partna defigurace olecrana, palp nebolestivá, bez proteplení, hmatná fluktuace, hybnost pně, NCp v normě

Zá: burzitis olecrani lat. sin

TH: punkce 14ml čiré synovie, instilace 8mg DM az 2mlmesocainu, elastik

Dop: chladit místo punkce, analgetika d.p., klidový režim, elastik opakovaně, kontrola u ošetřujícího ortopedá

Zapsal a tiskl: [redacted]



**Chirurgické oddělení**

Adresa

Identifikace

Narozen/a

Pohlaví

Plátce

**Návštěva ambulance / ordinace**

Dg.

Přichází s burzitidou L lokte, před 2 měs. s tím na ort.  
Obj: palp. hmatná boule na olekranu, flukt., bez inflam., hybnost plná  
Dop: doporuč. ko na ortopedii s punkcý a extrakcí