

Souhrnná výsledková zpráva

Název vyšetření *	Výsledek	Meze	Jednotka
Imunologie, autoimunita			
Revmatologický blok			
RF IgM ELISA.....	26,900 Pozitivní	0,000 - 17,990	U/ml
RF IgA ELISA.....	7,700 Negativní	0,000 - 17,990	U/ml
RF IgG ELISA.....	12,200 Negativní	0,000 - 17,990	U/ml
Anti-CCP IgA ELISA.....	0,470 Negativní	0,000 - 0,891	
Anti-CCP IgG ELISA.....	0,430 Negativní	0,000 - 0,891	
Myositis - profil			
anti-Mi-2.....	Negativní		
anti-Ku.....	Negativní		
anti-PM-Scl100.....	Negativní		
anti-PM-Scl 75.....	Negativní		
anti-Jo-1.....	Negativní		
anti-SRP.....	Negativní		
anti-PL-7.....	Negativní		
anti-PL-12.....	Negativní		
anti-EJ.....	Negativní		
anti-OJ.....	Negativní		
anti-Ro-52.....	Pozitivní		
Komentář: IgG protilátky proti antigenům Ro-52 metodou imunoblot pozitivní. IgG protilátky proti antigenům Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ metodou imunoblot negativní.			

4. 4 2022

Autoprotilátky org. nespecifické

ANF (ANA) IF.....	1:5120 Pozitivní		
Anti-ENA ELISA.....	6,010 Pozitivní	0,000 - 1,000	
Anti-Sm ELISA.....	0,100 Negativní	0,000 - 1,000	
Anti-SS-A ELISA.....	2,680 Pozitivní	0,000 - 1,000	
Anti-SS-B ELISA.....	1,990 Pozitivní	0,000 - 1,000	
Anti-Sm/U1RNP ELISA.....	0,110 Negativní	0,000 - 1,000	
Anti-RNP-70 ELISA.....	0,120 Negativní	0,000 - 1,000	
Anti-Scl-70 ELISA.....	0,240 Negativní	0,000 - 1,000	
Anti-Centromera B ELISA.....	0,120 Negativní	0,000 - 1,000	
Anti-Jo-1 ELISA.....	0,110 Negativní	0,000 - 1,000	

Komentář: ANF - zrnitý typ fluorescence.

Vytisknuto: 11.04.2022 14:15

Souhrnná výsledková zpráva

Název vyšetření	Hodnocení	Výsledek	Meze	Jednotka
Syst. sklerodermie profil IgG Imunoblot.....	Pozitivní			
Reaguje se specifickými antigeny: R0-52, Scl-70				
Myopatie profil IgG Imunoblot.....	Pozitivní			
Reaguje se specifickými antigeny: Ro52				
Komentář: Pacient u nás vyšetřen na autoprottilátky poprvé. Tento typ autoprottilátek může být asociován s onemocněním: anti Scl-70: polymyozitidy, dermatomyozitidy a progresivní systémové sklerózy ***** Nález autoprottilátek je NUTNO posuzovat v kontextu s klinickým stavem pacienta !!! Doporučujeme vyšetření opakovat (za 6 měsíců) dle klinického stavu pacienta.				

Vytisknuto: 11.04.2022 12:28