

OA: viz dg.
 FA: 0
 AA: neguje
 EA: 0

NO: delší dobu hyperemie, otok i svědění kůže periorbitálně, za PL nebyla, Bepanten bez efektu, spíš zhoršení, bez jiných polží.

Obj:

TK 180/90 mm Hg, TF 70/min, SpO2 99% bez O2

Př vědomí, orientovaná, afebrilní, neopocaná, bez ikteru, bez dušnosti, bez cyanózy, dýchání čisté, srdeční akce pravidelná, břicho aperitoneální, DKK bez otoků, lokální hyperemie, proteplení kůže periorbitálně, drobné defekty, praskliny kůže, vpravo

EKG: s.r. se SF 68/min, PQ 0,16, QRS 0,1, QT 0,36, bez KES, qR II, III, V4-6 nezn. star. data

Výsledky:

10.4.2026 07:33

Metabolismus dusíku: S-Urea: 4,5 S-Kreatinin enzymaticky: 54 PT(KIDN)-eGFR CKD-EPI (kreatinin): > 1,500 PT(KIDN)-eGFR (CKD-EPI kreat.) - hodnocení: G1 S-Kyselina močová: 290

Minerály: S-Na: 144 S-K: 3,7 S-Cl: 103 S-Mg: 0,76

Bilirubin: S-Bilirubin: 11,0

Enzymy: S-ALT: 0,46 S-AST: 0,51 S-GGT: 0,23 S-ALP: 1,14 S-LD: 3,43 S-CK: 2,69

FIB4 a ELF score: PT-FIB-4 skóre: 0,9

Proteiny: S-Celková bílkovina: 74,7 S-Albumin: 46,0 S-CRP: < 1,0

Glycidy: S-Glukóza: 3,8

Štítná žláza: S-FT4: 17,83 S-TSH: 0,924

Krevní obraz: B-Leukocyty přístrojově [WBC]: 5,45 B-Erytrocyty přístrojově [RBC]: 3,94 B-Hemoglobin [HB]: 119 B-Hematokrit [HCT]: 0,354 ERC(B)-Stř. objem erytrocytů [MCV]: 89,8 ERC(B)-Barvo erytrocytů [MCH]: 30,2 ERC(B)-Stř. barevná kon. [MCHC]: 336 ERC(B)-Erytr. křivka [RDW-CV]: 0,124 B-Trombocyty přístrojově [PLT]: 406 PLT(B)-Tromb. stř. obj. [MPV]: 8,8 B-Trombocytární hematokrit [PCT]: 3,60 PLT(B)-Tromb. křivka [PDW-SD]: 8,6

Krev-periferie/příst: B-Granulocyt nezralý - abs. poč.: 0,03 B-Neutrofilly - abs. poč.: 3,37 B-Lymfocyty - abs. poč.: 1,49 B-Monocyty - abs. poč.: 0,44 B-Eozinofilly - abs. poč.: 0,07 B-Bazofily - abs. počet: 0,05 LKC(B)-Granulocyt nezralý: 0,006 LKC(B)-Neutrofilly: 0,818 LKC(B)-Lymfocyt: 0,273 LKC(B)-Monocyt: 0,081 LKC(B)-Eozinofilly: 0,013 LKC(B)-Bazofily: 0,009

Základní koagulace: Antikoagulační léčba: žádná P-Protrombinový test (Quick): 11,0 P-Protrombinový test - normál: 10,4 P-Protrombinový test - poměr: 1,06 P(C)-Protrombinový test - INR: 1,06 P-APTT: 26,4 P-APTT normál: 27,2 P-APTT poměr: 0,97

Závěr:

Dermatitida v.s.

- k amb. kontrole i dovyšetření

Arteriální hypertenze, v. s. hypert. bil. pláště.

- k amb. kontrole cestou PL

Ambulantně:

Dithiaden 1 amp + FR 100 ml

SoluMedrol 80 mg + FR 100 ml

Ga++ 10% 20 ml + FR 250 ml

Doporučení:

Dieta hypoalergenní, Dostatečný perorální příjem tekutin.

Kontrola TK 2x denně

Časná kontrola dermatologické, event. alergologické vyšetření

Medikace:

Prednison 20 mg tbl 1-1/2-0 (06:00- 10:00-)